




# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



## S.R.P.V. POITOU – CHARENTES

Bulletin technique n° 27 du 24 Septembre 2008 (1 page)

# Grandes Cultures

### COLZA : Stade levée à 5 feuilles

#### Petites altises

Leur activité n'a pas progressé et reste faible dans de nombreuses situations.

*Maintenir la surveillance jusqu'au stade B2-B3, notamment à proximité de repousses ; évaluer la fréquence d'attaque avant d'envisager une intervention.*

#### Tenthredes

Quelques captures supplémentaires sont intervenues ; les toutes **premières larves** sont observées ainsi que le début des attaques, de façon très ponctuelle à ce jour.

*A surveiller, intervenir en cas d'observation d'attaques en progression..*

#### Grosses altises

De faibles captures (1 à 9 par piège) sont signalées dans de nombreux sites ; les captures ne sont significatives que dans une situation en Charente.

Ces valeurs indiquent que le vol vient de commencer et que son intensité est **faible** pour l'instant (sauf cas particuliers).

*Ne pas intervenir à court terme vis-à-vis de ce ravageur encore peu présent, de plus les températures fraîches retardent la date de début des pontes et donc la date optimum d'intervention éventuelle visant à éviter les dégâts ultérieurs dus aux larves.*

#### Pucerons

A la tour, le vol n'a pas commencé.

Les pièges suivis par le groupe Terrena, dans le cadre du réseau vigie-viroses, indiquent un début de captures en Vienne et Nord Deux-Sèvres.

Les observations sur repousses montrent une faible activité pour l'instant.

*A surveiller*

### Limaces

Les conditions sèches sont défavorables à leur activité.

Notamment en Vienne, les fortes attaques observées 1ère quinzaine de septembre, ont été difficiles à contrôler et ont entraîné des resemis de parcelles ou de parties de parcelles.

### Autres ravageurs

- 2 captures de **charançons du bourgeon terminal** sont signalées en Deux-Sèvres ;
- Des dégâts dus aux **taupins** sont observés de façon ponctuelle (Venduvre en Vienne) ; les colzas peu développés, en conditions peu poussantes, sont davantage sensibles à l'activité des taupins.

### Phoma

Le maintien de conditions sèches n'est pas favorable à l'évolution de l'inoculum.

A Biard, la maturation n'a que très faiblement progressé.

Aucune projection de spores n'a été observée.

## TOUTES CULTURES

### Campagnols

Les suivis des campagnols des champs effectués en Deux-Sèvres et Charente-Maritime montrent que les populations sont très faibles.

### COLZA

**Tenthredes**  
Observation des  
premières larves  
A surveiller

**Grosses altises**  
Début du vol

Direction Régionale de  
l'Agriculture et de la  
Forêt  
Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
13 Route de la forêt  
86580 BIARD  
Tél : 05 49 62 98 25  
Fax : 05 49 62 98 26

Directrice gérante :  
S. DUTARTRE

Site internet : [www.srpv-poitoucharentes.com](http://www.srpv-poitoucharentes.com)  
E-mail : [srpv.draf-poitoucharentes@agriculture.gouv.fr](mailto:srpv.draf-poitoucharentes@agriculture.gouv.fr)  
Publication périodique  
C.P.A.P. n°1664-AD  
ISSN n°0294-4693